

PRO SCIENTIA ATQUE SALUTE
REIPUBLIQUE
LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
PURCHASED 1923 FROM
GENEVA BOTANICAL GARDEN
Septemb 1899
R.W. Gibson. Invt

QK315
.H328
atlas
v.1

Atragene alpina L. — Alpenrebe.

Alpenkette, Gebüsch, 800—1400 M. Juni, Juli.

Thalictrum alpinum L. — Alpen-Wiesenraute.

Centralalpenkette, Schweiz bis Steiermark, feuchte Stellen. 1800–2300 M. Juli, August.

Anemone narcissiflora L. — Narzissenblüthiges Windröschen.

Alpenkette, auf Triften, bes. auf Kalkboden, 1300—1900 M. Juni—Juli.

Anemone Baldensis L. — Monte Baldo's Windröschen.

Alpenkette auf Triften zerstr. 1800—2400 M. Juni—Juli.

Anemone trifolia L. — Dreiblättriges Windröschen.

Südliche Alpenkette, Süd-Tirol bis Krain, bis 1600 M. April—Juli.

Anemone vernalis L. — Frühlings-Windröschen.

Alpenkette bis Steiermark, 1200—2300 M. Mai—Juli.

Anemone alpina L. — Alpen-Windröschen.

Nördliche und südliche Alpenkette, Wiesen, 1600—2200 M. Juni—August.

Anemone Burseriana Scop. = grandiflora Hoppe. — Bursers Windröschen.

Centralalpenkette, Wiesen, 1600—2300 M., Juni, August.

Anemone sulfurea L. — Schwefelgelbes Windröschen.

Alpenkette, auf Schiefer u. Kalkboden, bei 1000—2300 M. Juni—August.

Ranunculus rutaefolius L. — Rautenblättriger Hahnenfuss.

Alpenkette, auf Urgestein und Kalk, 1900—2500 M. Juli—August.

Ranunculus anemonoides Zahlb. — Windröschenartiger Hahnenfuss.

Südtirol, Nied.-Oesterreich u. Steiermark, feuchte Stellen, 1500 – 2200 M., bes. auf Kalk, März—April.

Ranunculus Pyrenaeus L. — Pyrenäischer Hahnenfuss

Schweiz bis Kärnthen, 1800—2400 M Juni—Juli

Ranunculus parnassifolius L. — Parnassienblättriger Hahnenfuss.

Alpenkette, trockene Stellen, 2500—3100 M. Juli, August.

Ranunculus glacialis L. — Gletscher-Hahnenfuss.

Alpenkette, feuchte Stellen, auf Urgestein, 2200—2500 M. Juli, August.

Ranunculus Seguieri Vill. — Seguier's Hahnenfuss.

Südtirol und Krain, auf Kalk, 1900—2300 M. Juli—August.

Ranunculus alpestris L. — Alpen-Hahnenfuss.

Alpenkette, auf Kiesstellen, 700—2000 M. Mai—August



Ranunculus Traunfellneri Hoppe. — Traunfellner's Hahnenfuss.

Ostalpen (Tirol bis Krain), auf Kalkboden, ca. 1500 M Juni, Juli

Ranunculus crenatus Waldst. & Kit. — Kerbblättriger Hahnenfuss.

Alpentriften in Obersteiermark, auf Urgestein, 1100—2000 M. Juli, August

fo *fr* *fo*

Ranunculus bilobus Bertol. = Bertolonii Hausm. — Zweilappiger Hahnenfuss.

Kalkfelsen in Südtirol, 1500—1800 M Juli, August

Ranunculus aconitifolius L. — Eisenhutblättriger Hahnenfuss.

Alpenkette, feuchte Stellen, 600—1800 M., auf Urgestein und Kalk. Juni—August.

Ranunculus Pythora Crntz (1769) = hybridus Bir (1811) —
Tödtlicher Hahnenfuss.

Alpenkette, auf Gerölle, 1500—2200 M. Juni—Juli.

Ranunculus Thora L. — Giftiger Hahnenfuss.
Schweiz bis Krain, trockene Stellen, 1600–1900 M., Mai, Juni.

Ranunculus pygmaeus Wahlb. = Tappeineri Bamb. — Zwergiger Hahnenfuss.

Tirol, Salzburg u. Kärnten, feuchte Stellen, 2200–2500 M. auf Urgestein. Juli, August.

Ranunculus Breyninus Crntz. (1769) = Villarsii Koch et aut. germ. nec de Cand. — Breyn- (Rax) Alpen-Hahnenfuss.

Alpenkette, trockene Stellen, bis 2500 M., Mai — Juli.

Ranunculus montanus. Willd. — Berg-Hahnenfuss.

Alpenkette, bes. auf Kalk, 1500—2500 M. Juni—August.

Ranunculus Carinthiacus Hoppe = gracilis Schleich. 1815. — Kärntnerischer Hahnenfuss.

Östliche Alpenkette, trockene Stellen, bis 2300 M., Juni – August.

Trollius Europaeus L. — Europäische Trollblume

Alpenkette, feuchte Stellen bis 2400 M. Mai—August.

Eranthis hiemalis (L.) Salisb. — Gemeine Winterblume.

Alpenkette, bis in die subalpine Region verbr., doch selten. Februar, März.

Helleborus niger L. — Schwarze Niesswurz

Alpenkette, bes. auf Kalkboden, 800—1800 M. März Mai.

Aquilegia atrata Koch. — Schwärzlicher Akelei.

Alpenkette, Gebüsch bis 1800 M. Juni, Juli.

Delphinium Tiroliense Kern. i. Sch. — Tirolischer Rittersporn.

Nordtirol, bei 1600 M. Juli, August.

Aconitum Anthora L. — Giftheil-Eisenhut.

Schweiz bis Oesterreich und Krain, trockene Stellen, bis 1800 M., Juli—August.

Papaver alpinum L. — Alpen-Mohn

Alpenkette, trockene Stellen, 1900—2500 M. Juli, August.

Papaver pyrenaeicum (L.) Willd. — Pyrenäischer Mohn.

Alpenkette, bes. auf Kalkboden, 2100—2700 M. Juli, August.

Arabis alpina L. — Alpen-Gänsekresse.

Alpenkette, trockene Stellen, 1300—2200 M. bes. auf Kalk. Mai—August

Arabis coerulea (All.) Haenke. — Blaue Gänsekresse.

Alpenkette, bes. auf Kalkgerölle 1900—2500 M. Juli—August

Arabis alpestris Schleich. = ciliata Koch nec R. Br. — Voralpen-Gänsekresse.

Alpenkette, trockene Stellen, 1300—1900 M., auf Kalk, Mai—Juli.

Arabis pumila Jacq. — Niedrige Gänsekresse.

Alpenkette, trockene Stellen, bes. auf Kalk, 1600—2000 M. Juni, Juli.

Arabis bellidifolia (L.) Jacq. — Massliebblättrige Gänsekresse.
Alpenkette, feuchte Stellen, 1600–2000 M. April–Juli.

Arabis Halleri L. — Haller's Gänsekresse.

Alpenkette, Wiesen, trockene Stellen, bis 2000 M. Juni, Juli.

Cardamine asarifolia L. — Haselwurzblättriges Schaumkraut.

Südl. Schweiz und Südtirol, feuchte Stellen, bis 1500 M., Juni, Juli.

Cardamine alpina L. — Alpen-Schaumkraut.

Alpenkette, feuchte und trockene Stellen, 1200–2500 M., bes. auf Urgestein. Juni, Juli.

Cardamine trifolia L. — Dreiblättriges Schaumkraut.

Tirol bis Kärnten, bes. auf Kalk, bis 1500 M. Mai—Juni.

Cardamine resedifolia L. — Resedenblättriges Schaumkraut.
Alpenkette, auf Urgestein, 1600—2300 M. Juni, Juli.

Dentaria enneaphyllos L. — Neunblättrige Zahnwurz.

Tirol bis Oesterreich, feuchte Stellen, bis 1800 M., April—Mai.

Braya alpina Sternb. & Hoppe. — Alpen-Braye, Knotenschötchen.

Tirol und Kärnten, trockene Stellen, 1900—2300 M., Juli, August.

Braya dentata (All. 1785) = pinnatifida, Lam. (1789 sub Sisymbr.)
— Gezähnte Braye, Knotenschötchen.

Schweiz: Waadt, Wallis bis zum Umbrail, auf Urgestein. Juli, August.

Erysimum pumilum Gaud. = alpinum Hegetschw. — Niedrige Schottendotter.

Alpenkette, trockene Stellen, 1200—2000 M. Mai, Juni.

Alyssum Wulfenianum Bernh. = alpestre Wulf. nec L. — Wulfen's Steinkraut.

Schweiz, Tirol bis Krain, trockene Stellen, um 1700 M., auf Urgestein, Juli—August.

Petrocallis Pyrenaica (L.) R. Brown. — Pyrenäisches Steinschmückel.

Alpenkette, auf Kalk, 2200—2800 M. Juni—Juli

Draba Hoppeana Reichb. (1828) nec Rud. = Zahlbruckneri Host. 1831. — Hoppe's Hungerblümchen.

Centralalpenkette, Schweiz bis Steiermark, trockene Stellen, 2200—2500 M., auf Urgestein, bes. Granit, Mai–Juli.



Draba aizoides L. — Immergrünes Hungerblümchen.

Alpenkette, bes. auf Kalkboden, 1600—1900 M. Mai Juli.

Draba tomentosa Wahlb. — Filziges Hungerblümchen.

Alpenkette, trockene Stellen, 1900—2500 M., auf Kalk. Juni, Juli.

Draba dubia Sut. (1802) = frigida Saut. 1825. — Zweifelhaftes Hungerblümchen.

Alpenkette, trockene Stellen, 1600—2200 M., Juni, Juli.

Draba stellata Jacq. — Sternhaariges Hungerblümchen.

Ostalpen bis zur Salza, trockene Stellen, über 1800 M. auf Kalk, Juni, Juli.

Draba nivea Saut. — Schneeweisses Hungerblümchen.
Tirol, Kärnten, trockene Stellen, um 1800 M., Juli, August.

Draba Traunsteineri Hoppe = frigida × Johannis. — Traunsteiner's Hungerblümchen.

Schweiz? Tirol und Oberbaiern, trockene Stellen, 1600–2200 M., Juni, Juli.

Draba Johannis Host. — Johann's Hungerblümchen.
Alpenkette, Wiesen, trockene Stellen, 2200–2500 M. Juni–Juli.

Draba Fladnitzensis Wulf. = Wahlenbergi var. α homotricha Lindb. — Fladnitz'sches Hungerblümchen.

Alpenkette, trockene Stellen, 1300–2500 M., besonders auf Schiefer. Juni–Juli.

Draba incana L. — Weissgraues Hungerblümchen.
Schweiz bis Krain, trockene Stellen, 1300–1700 M., Mai–Juli.

Draba Thomasii Koch — Thoma's Hungerblümchen.

Schweiz und Tirol, trockene Stellen, 1200—2000 M. Mai, Juni.

Cochlearia saxatilis L. = Kernera sax. Reich. — Stein-Löffelkraut.

Alpenkette, trockene Stellen, 1300—2200 M., auf Kalk. Mai, Juni.

Cochlearia alpina (Tausch) = brevicaulis Facch. — Alpen-Löffelkraut.

Gerölle der Kalkalpen in Südtirol, bis 2000 M. Juli, August.

Thlaspi cepeaefolium (Wulf) Koch. — Fetthennenblättriges Täschelkraut.

Kärnten, Raiblthal, auf Kalkgerölle bis 2000 M. Mai, Juni.

Thlaspi alpinum Crntz. — Alpen-Täschelkraut.

Alpenkette, Wiesen, 1900—2500 M. Juni, Juli.

Thlaspi rotundifolium (L.) Gaud. — Rundblättriges Täschelkraut.

Alpenkette, auf Kalkgerölle, 1900—2700 M. Juli—August.

Biscutella laevigata L. — Glattfrüchtiges Brillenschötchen.

Alpenkette, Triften, bes. auf Kalk. bis 2000 M. Juli, August

Hutchinsia alpina (L.) R. Br. — Alpen-Hutchinsie. Felsenkresse.

Alpenkette, bes. auf Kalkboden, 1700—2700 M. Juni—August.

Hutschinsia brevicaulis (Hoppe) R. Br. — Kurzstengelige Hutschinsie, Felsenkresse.

Alpenkette, feuchte Stellen, 2000—3000 M. auf Urgestein, Juli, August.

Aethionema saxatile (L.) R. Brown. — Steinkresse

Alpenkette, auf Kalkboden, [illegible] – 1600 M. Mai – Juni

Helianthemum alpestre (Scop.) Reichb. = Olandicum Wahlb. var. β hirtum Koch. — Voralpen-Sommerröschen.

Kalkalpenkette, trockene Stellen, 1300–2600 M. Juli—August.

Helianthemum serpyllitolium (Crntz.) Reichb. = vulg Gärtn. var. γ glabrum Koch. — Thymianblättriges Sonnenröschen.

Alpenkette: trockene Stellen, 1600—2500 M Juni—August.

Viola pinnata L. — Fiederblättriges Veilchen.

Schweiz bis Krain, auf Triften, 1300—1800 M. Juni—Juli.

Viola Thomasiana Perr. & Song. = ambigua Koch et aut., nec Waldst. & Kit. — Thomas-Veilchen.

Schweiz und Tirol: Pusterthal, trockene Stellen, 900–2500 M. Mai–Juni.

Viola biflora L. — Zweiblüthiges Veilchen.

Alpenkette, Gebüsch, 1000—2100 M. Mai—August.

Viola alpina L. — Alpen-Veilchen.

Oestliche Alpen bis zur Enns, Triften, 1600—1900 M. Juni, Juli.

Viola Cenisia L. — Mont Cenis' Veilchen.

Schweiz und Südtirol, trockene Stellen, über 1800 M., Juli, August.

Viola calcarata L. — Langsporniges Veilchen.
Kalkalpenkette, Wiesen, 1800—2700 M., Juni—August.

Viola heterophylla Bertol. = Valderia aut. nec All. — Verschiedenblättriges Veilchen.

Südtirol, trockene Stellen, 1600—2200 M., auf Kalk, Juli, August.

Polygala Chamaebuxus L. — Immergrüne Kreuzblume.

Alpenkette, trockene Stellen, Gebüsch, bis 2000 M. Mai— August.

Polygala alpestris Reichenb. — amara L. var. aut. pl. — Voralpen-Kreuzblume.

Alpenkette, bes. auf Kalkboden, bis 1700 M. April—Juli.

Gypsophila repens L. — Kriechendes Gypskraut.

Kalkalpenkette, auf Gerölle, 1300—2400 M. Juli—August.

Dianthus alpinus L. — Alpen-Nelke.

Ostalpen, auf Kalkboden, 1000—2000 M. Juni—August.

Dianthus glacialis Hänke. — Gletscher-Nelke.

Alpenkette, auf Urgestein, 1900—2500 M. Juli—August.

Dianthus speciosus Reichb. = superbus L. var. — Ansehnliche Nelke.

Süd-Schweiz und Südtirol, Wiesen, 1600—2400 M., Juli, August.

Dianthus alpestris, Sternb. & Hoppe = Monspessulanus L. var. ζ alpicola Koch. — Voralpen-Nelke.

Südtirol bis Krain, Wiesen, 1600—2400 M., auf Kalk und Urgestein, Juli, August.

Saponaria ocymoides L. — Basilicumartiges Seifenkraut.

Schweiz bis Kärnten, trockene Stellen, bis 2300 M., besonders auf Kalk. Mai–August.

Silene Pumilio (L.) Wulf. — Zwergiges Leinkraut

Centralalpenkette, östlich vom Schlern, 1900 – 2700 M. Juli – August

Silene quadrifida (L.) — Vierspaltiges Leimkraut.
Alpenkette, feuchte Stellen, 1000—2000 M. auf Kalk. Juli—August.

Silene saxifraga L. — Steinbrechendes Leimkraut.
Südl. Alpenkette. Schweiz bis Krain, Gebüsch bis 2000 M., Juli, August.



Silene acaulis L. — Stengelloses Leimkraut.

Alpenkette, bes. auf Kalkboden. 1600—3000 M. Juni – August.



Lychnis alpina L. — Alpen-Lichtnelke.

Schweiz bis Kärnten, bes. auf Granit, 2500—3000 M. Juli, August.

Sagina glabra (Willd.) Koch = repens Burn. --- Kahles Mastkraut.
Schweiz, Südtirol und Salzburg, feuchte Stellen, 1600—2000 M., Juli, August.



Sagina saginoides (L.) = Linnaei Presl. 1819; saxatilis Wimm. 1840. — Linné's Mastkraut.

Alpenkette, Wiesen, 1300—2000 M., Juni—August.

Alsine rupestris (Scop. 1772). = lanceolata All. 1785 sub Aren; Mert. & Koch. — Felsen-Miere.

Alpenkette bis Krain, trockene Stellen, 1900—2500 M., Juli, August.

Alsine laricifolia (L.) Wahlenb. — Lärchenblättrige Miere.

Centralalpenkette, trockene Stellen, 1700–2100 M., Juli, August.

Alsine recurva (All.) Wahlenb. — Krummblättrige Miere.
Schweiz bis Kärnten, trockene Stellen, 1700—2700 M. Juli—August.

Alsine Austriaca (Jacq.) Mert. & Koch. — Oesterreich. Miere.

Kalkalpenkette, trockene Stellen, 1700—2300 M. Juli—August.



Cherleria sedoides L. = Alsine Cherleri Fenzl. — Fettblattartige Cherlerie, Zwergmiere.

Alpenkette, trockene Stellen, 1300–3000 M. bes. auf Kalk, Juli–September.

Möhringia glaucovirens Bert. (1844) = glauca Leyb. (1853)
— Blaugrüne Möhringie.

Südliches Tirol, feuchte Stellen, bis 1800 M., auf Dolomit, Juli—August.

Möhringia muscosa L. — Moosartige Möhringie, Moosmiere.

Alpenkette, feuchte Stellen, bis 2000 M. bes. auf Kalk, Juni—September.

Möhringia ciliata (Scop. 1772). = polygonoides Wulf. 1786 sub Arenar. = obtusa All. 1785 sub Arenar. — Wimperige Möhringie, Moosmiere.

Alpenkette, feuchte Stellen, 1700—2300 M., bes. auf Urgestein, Juni, August.

Arenaria biflora L. — Zweiblüthiges Sandkraut.

Alpenkette, feuchte Stellen, 2200—3200 M. auf Urgestein, Juli, August.



Arenaria ciliata L. — Gewimpertes Sandkraut

Alpenkette, auf Triften, bis 2700 M. Juli—August

Arenaria grandiflora L. — Grossblüthiges Sandkraut.
Westl. Schweiz, Tirol bis Oesterreich u. Krain, trockene Stellen, 1200—2000 M., Mai—Juli.

Stellaria cerastioides L. = Cerastium trigonum Vill. — Hornkrautartige Sternmiere.

Centralalpenkette, feuchte Stellen, 1600—2200 M., Juli—August.

Cerastium latifolium L. — Breitblättriges Hornkraut.

Kalkalpenkette, trockene Stellen, 1900—2800 M. Juli, August.

Cerastium uniflorum Murr. (1810) = latifolium L. var. δ glaciale Koch — glaciale Gaud. 1824. — Einblüthiges Hornkraut.

Alpenkette, trockene Stellen, 2100 -3300 M., auf Urgestein, August, September.

Cerastium alpinum L. — Alpen-Hornkraut.

Alpenkette, trockene Stellen, 1600—2000 M., Mai—August.

Cerastium Carinthiacum Vest. (1810) = ovatum Hoppe 1818.
— Kärntnerisches Hornkraut.

Oestl. Alpenkette, Tirol bis Oesterreich, trockene Stellen, 1000–1900 M., Juni – August.

Linum alpinum Jacq. — Alpen-Lein.

Oestliche Alpenkette, Wiesen. 1500—2000 M. Juni, Juli.

Geranium argenteum L. — Silberweisser Storchschnabel.

Südtirol und Krain, auf Kalkfelsen, 1600—2000 M. Juli—August.

Geranium macrorrhizum L. — Grosswurzeliger Storchschnabel.

Südl. Alpenkette, Tirol bis Krain, Gebüsch bis 1600 M. Juli–August.

Rhamnus pumila L. — Niedriger Kreuzdorn.

Alpenkette, trockene Stellen, 1300—1900 M. auf Kalk. Juni—August.

Cytisus radiatus (L.) Koch. — Strahlblättriger Bohnenbaum.

Südtirol und Kärnten, trockene Stellen, bis 1600 M. Mai—Juni.

Ononis rotundifolia L. — Rundblättrige Hauhechel.

Schweiz bis Kärnten, trockene Stellen, bis 1600 M., Mai—Juli.

Anthyllis alpestris Hegetschw. — Voralpen-Wundklee.

Schweiz und Salzburg, Wiesen, 1300—2200 M., Mai—Juli.

Trifolium alpinum L. — Alpenklee.
Schweiz und Tirol, Wiesen, 1600—2200 M. Juni—August.

Trifolium pallescens Schreb. — Weisslicher Klee.

Schweiz bis Salzburg und Krain, Wiesen, 1900–2500 M. bes. auf Granit, Juli-September.

Trifolium Thalii Vill. (1786) = caespitosum aut. (false Reyn. 1787) — Thal's Klee.

Schweiz und Tirol, Wiesen, 1600—2200 M., Juli, August.

Trifolium saxatile All. — Felsenklee.

Schweiz und Tirol, Gletscher, 1600–2500 M. Juli–August.

Trifolium Noricum Wulf. — Norischer Klee.

Südtirol bis Steiermark und Krain, trockene Stellen, 2000—2600 M., Juli, August.

Trifolium agrarium L. = badium Schreb. — Feldklee.
Alpenkette, Wiesen, 1300–2300 M., besonders auf Kalk. Juli—August.

Phaca frigida L. — Kälteliebende Berglinse.

Alpenkette, Wiesen, 1700—2000 M. bes. auf Urgestein, Juli–August.

Phaca alpina Jacq. — Alpen-Berglinse.

Schweiz bis Salzburg und Krain, 1300—1900 M. Juli—August.

Oxytropis Halleri Bunge. — Hallers Spitzkiel.

Schweiz, Tirol, Salzburg u. Kärnten, trockene Stellen, 1900—2400 M. Juli, August.

New York Botanical Garden Library
QK 315 .H328 v.1 gen
Hartinger, Anton/Atlas der Alpenflora
3 5185 00108 4035